

ARTÍCULO ESPECIAL

Nuevas tecnologías genómicas y su aplicación en pediatría

Damià Heine Suñer*, Víctor José Asensio y Laura Torres Juan

Unitat de Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica, Hospital Universitari Son Espases, Palma, Mallorca, España

Recibido el 20 de noviembre de 2024; aceptado el 2 de mayo de 2025

PALABRAS CLAVE

Diagnóstico genético; Enfermedades pediátricas; Variantes genómicas; Secuenciación; Microarrays; NGS; Secuenciación larga; OGM; MLPA; Cariotipo; Secuenciación Sanger; WES; WGS; RNAseq

Resumen El desarrollo de tecnologías genómicas ha transformado la práctica de la pediatría, permitiendo avances significativos en el diagnóstico de enfermedades genéticas, el 70% de las cuales comienzan en la infancia. Las variaciones genómicas, que van desde cambios en un solo nucleótido hasta grandes reorganizaciones cromosómicas, son responsables de muchas enfermedades pediátricas, y su detección depende de la selección adecuada de tecnologías. Métodos como el cariotipo, MLPA, *microarrays*, secuenciación Sanger y secuenciación de nueva generación (*Next Generation Sequencing [NGS]*) han incrementado la capacidad diagnóstica, aunque, en general, solo el 27% de los casos pediátricos alcanzan un diagnóstico definitivo. Los paneles de genes, exomas, genomas y RNAseq ofrecen diferentes rendimientos diagnósticos según la complejidad del caso clínico, con tasas que pueden alcanzar hasta el 75% en cohortes específicas. Además, tecnologías emergentes como la secuenciación de lectura larga y el mapeo óptico del genoma han demostrado utilidad en la identificación de variantes estructurales complejas y regiones repetitivas del genoma. La integración de un fenotipado clínico exhaustivo y herramientas como el vocabulario estandarizado de fenotipos de *Human Phenotype Ontology (HPO)* optimiza la priorización de variantes genéticas y mejora la precisión diagnóstica. Este artículo revisa las capacidades, las limitaciones y las aplicaciones clínicas de las técnicas genómicas disponibles en la actualidad, resaltando diferencias, ventajas y desventajas, y sus implicaciones para el diagnóstico en pediatría.

© 2025 Asociación Española de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

* Autor para correspondencia.

Correos electrónicos: damian.heine@ssib.es, damia.heine@gmail.com (D. Heine Suñer).

KEYWORDS

Genetic diagnosis;
Pediatric diseases;
Genomic variants;
Sequencing;
Microarrays;
NGS;
Long-read sequencing;
OGM;
MLPA;
Karyotyping;
Sanger sequencing;
WES;
WGS;
RNA-Seq

New genomic technologies and their application in pediatric care

Abstract The development of genomic technologies has transformed pediatric practice, enabling significant advances in the diagnosis of genetic diseases, 70% of which manifest during childhood. Genomic variants, ranging from single-nucleotide changes to large chromosomal rearrangements, are responsible for many pediatric conditions, and their detection relies on the appropriate selection of technologies. Methods such as karyotyping, MLPA, microarrays, Sanger sequencing, and next-generation sequencing (NGS) have increased diagnostic capacity, although, on average, a definitive diagnosis is currently made in only 27% of pediatric cases. Gene panels and exome, genome, and RNA sequencing offer varying diagnostic yields depending on clinical complexity, with rates that may be as high as 75% in specific cohorts. Additionally, emerging technologies such as long-read sequencing and optical genome mapping have proven useful in identifying complex structural variants and repetitive genomic regions. The integration of comprehensive clinical phenotyping and tools like the Human Phenotype Ontology (HPO) standard vocabulary optimizes genetic variant prioritization and enhances diagnostic accuracy. This article reviews the capabilities, limitations and clinical applications of currently available genomic techniques, highlighting their differences, advantages and disadvantages as well as implications for diagnostics in pediatrics.

© 2025 Asociación Española de Pediatría. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

El papel de la genética en la pediatría

El avance en tecnologías genómicas ha revolucionado el diagnóstico de enfermedades minoritarias de origen genético, el 70% de las cuales se manifiestan en la infancia¹. El desarrollo de herramientas de análisis eficientes han permitido incorporar la secuenciación de nueva o segunda generación (NGS) y los *microarrays* en la práctica clínica. Aunque estas técnicas han mejorado la capacidad diagnóstica, solo el 26,7% de los casos pediátricos logran un diagnóstico definitivo².

El proceso de diagnóstico puede ser largo, complejo y costoso. Actualmente el tiempo promedio estimado para un diagnóstico preciso es de 5 años y alrededor del 30% de los niños con una enfermedad minoritaria mueren antes de los 5 años¹. Durante este tiempo, tanto los pacientes como sus familias enfrentan desafíos emocionales y económicos significativos, mientras que el sistema de salud soporta una gran presión.

El análisis de la información genómica se ha convertido hoy en día en una herramienta imprescindible en el ámbito clínico. Contar con un diagnóstico genético contribuye a:

- Comprender la causa, la progresión de la enfermedad y la esperanza de vida.
- La identificación de otros familiares que puedan estar en riesgo de padecer la misma afectación, y ayudar con la planificación familiar mediante un adecuado asesoramiento genético.
- Poder acceder a tratamientos específicos (en el caso que existan para esa enfermedad) o participar en ensayos clínicos para el desarrollo de un tratamiento.
- Poder contactar con otras familias en la misma situación, y compartir experiencias y recursos.

Importancia de una óptima orientación clínica

Para maximizar la utilidad de las técnicas actuales de biología molecular, es esencial un fenotipado exhaustivo y preciso del paciente, que incluya una recopilación detallada de síntomas, manifestaciones clínicas y antecedentes médicos. Un fenotipado adecuado mejora el análisis de los datos genéticos, optimiza tiempos y reduce el riesgo de resultados ambiguos o no concluyentes.

La NGS puede detectar miles de variantes genéticas en un paciente, muchas de las cuales son de significado incierto (VUS). Sin embargo, un fenotipo claro permite priorizar las variantes más relevantes para las manifestaciones clínicas del paciente, descartando las menos significativas. Asimismo, los análisis del caso índice junto a sus padres (análisis en trío) permiten evitar en muchos casos variantes de significado incierto, priorizando variantes que son *de novo* o aquellas recesivas compuestas, heredadas de ambos progenitores.

Una herramienta ampliamente utilizada para estandarizar fenotipos y relacionarlos con genes, es la *Human Phenotype Ontology* (HPO) <https://hpo.jax.org/>³. El uso de HPO permite vincular datos fenotípicos directamente con datos genéticos, agilizando el análisis y priorización de variantes relevantes.

Tipos de variación en el genoma y su relación con la enfermedad

En el ámbito de la genómica, las variaciones en nuestro ADN son la base de la diversidad humana y, en muchos casos, la causa de enfermedades. Estas variaciones pueden ser de diferentes tipos y su tamaño y localización en el genoma pueden tener distintos efectos sobre la salud. Las *Structural Variants* (SVs) o variaciones estructurales, son

grandes alteraciones en la estructura de los cromosomas, como delecciones, duplicaciones, inversiones o translocaciones. Estas variaciones pueden afectar a grandes regiones del genoma y, por lo tanto, a múltiples genes. Las *Copy Number Variations* (CNVs) o variaciones en el número de copias son un tipo específico de SV que implica un aumento o disminución en el número de copias de una región particular del genoma. Ejemplos de enfermedades causadas por CNVs son el síndrome de Williams-Beuren causado por una delección en el cromosoma 7q11.23, el síndrome del maullido del gato causado por una delección en el brazo corto del cromosoma 5p15.2, o el síndrome de Prader-Willi y Angelman causados por delecciones en el cromosoma 15q11.2-q13. Las *Single Nucleotide Variant* (SNVs) o variantes de un solo nucleótido son cambios en un nucleótido. Aunque son cambios pequeños, pueden tener un gran impacto, sobre todo si ocurren en regiones codificantes de proteínas o zonas reguladoras de la expresión génica. Algunos ejemplos de enfermedades habitualmente causadas por este tipo de variación son la fibrosis quística, que está causada por mutaciones en el gen *CFTR*, la anemia falciforme, causada por una mutación en el gen de la hemoglobina, o la fenilcetonuria, causada por mutaciones en el gen *PAH*. Finalmente, un tercer tipo de variación en el genoma son las *Short Tandem Repeats* (STRs) o repeticiones cortas en tandem, que son secuencias cortas de ADN que se repiten en tandem un número variable de veces y que pueden expandirse hasta niveles patológicos. La mayor parte de enfermedades causadas por una expansión de STRs afectan al sistema neurológico. Algunos ejemplos, serían el síndrome de X-frágil, que está causado por la expansión de la secuencia CGG en el gen *FMR1* o la distrofia miotónica, que está causada por una expansión del triplete CTG en el gen *DMPK*. En resumen,

las SVs, CNVs, SNVs y las expansiones de STRs son diferentes tipos de variaciones genéticas que pueden causar enfermedades. La identificación de variantes es fundamental para el diagnóstico, el asesoramiento genético y el desarrollo de nuevas terapias. Sin embargo, cada una de las técnicas diagnósticas disponibles no necesariamente detecta todos los tipos de variantes. Por todo ello y debido a los rápidos avances tecnológicos, es común dudar a la hora de solicitar un estudio genético, surgiendo preguntas como: ¿qué técnicas y pruebas ofrecen un mejor rendimiento hoy en día atendiendo al fenotipo del paciente? ¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones de cada una de ellas? ¿Es mejor una prueba dirigida a un gen o síndrome concreto o pruebas no dirigidas que abarcan el genoma entero? A continuación, se intentará dar respuesta a estas preguntas.

Comparación de cariotipo, MLPA y microarrays para la detección de SVs y CNVs

La comparación entre cariotipo, *Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification* (MLPA) y microarrays para la detección de SVs en enfermedades genéticas pediátricas revela que cada técnica tiene fortalezas y limitaciones, lo que determina su utilidad en función del contexto clínico y diagnóstico (fig. 1).

El cariotipo ha sido durante décadas la herramienta principal para analizar el número y la estructura de los cromosomas. Éste permite identificar grandes alteraciones cromosómicas, como aneuploidías (cambios en el número de cromosomas, como en el síndrome de Down, caracterizado por una trisomía 21) y reordenamientos estructurales evidentes, como translocaciones, inversiones o grandes

Técnicas para detectar variaciones en número de copia (CNVs) y estructurales (SVs)							
	Dirigido/ No dirigido	¿En qué consiste?	¿Qué detecta?	Ejemplos de enfermedades	Rendimiento diagnóstico	Ventajas	Inconvenientes
RESOLUCIÓN 	No dirigido	Extensión sobre un soporte físico (crystal) de los 46 cromosomas (cariotipo) que luego es observada mediante un microscopio	-Aneuploidías. -Grandes delecciones o duplicaciones >10 Mb -Translocaciones e inversiones cromosómicas. -Triploidías	-Síndrome de Down (trisomía 21) -Síndrome de Turner (monosomía X) -Síndrome de Maullido de Gato (delección 5p-) -Translocación 11;22/síndrome de Emanuel	Bajo (3-10 % en pacientes con síndromes de neurodesarrollo) (Miller et al. 2010)	Detecta grandes reorganizaciones genómicas, incluidas las equilibradas como translocaciones e inversiones.	Muy baja resolución. Técnicamente laborioso y largo
	Dirigido	Amplificación de sondas por Ligación Múltiple. Es una técnica molecular que combina hibridación de sondas, ligación y PCR dirigido a un gen o unos pocos genes de interés	Delecciones y duplicaciones en genes y regiones concretas del genoma mediante paneles prediseñados. Tiene capacidad de detectar cambios epigenéticos (MS-MLPA)	-Talla/baja: delecciones gen SHOX -Charcot Marie Tooth 1A (duplicación) -Síndrome de 22q11.2DS (DiGeorge) -Síndrome de Prader Willi y Angelman	NA (depende de patología y orientación clínica)	Detecta delecciones y duplicaciones pequeñas	Solo detecta CNVs en uno o pocos genes
	Semi-dirigido	Miles o millones de fragmentos sintéticos de ADN sobre un soporte físico que interrogan cada uno de ellos una región del genoma problema y que se detectan mediante un fluoroforo o similar. Pueden ser SNP-arrays o CGH-arrays	Depende de la resolución y cobertura del microarray usado. En general, puede detectar CNVs de 50 kb o más en regiones con gran cobertura de sondas	-Síndrome de 22q11.2DS (DiGeorge) -Síndrome de Sotos -Síndrome de Williams -Síndrome de Wolf	15-20 % en pacientes con múltiples anomalías congénitas o trastornos del neurodesarrollo (Miller et al. 2010)	Rapidez. Mayor resolución que un cariotipo. Tiene la capacidad de detectar nuevas alteraciones no descritas y de pequeño tamaño	Falsos negativos por baja resolución o cobertura del array. Detecta variantes de significado clínico incierto (VUS).
Mapeo óptico genómico (OGM)	No dirigido	Utilizando moléculas de ADN de peso molecular elevado (150 kb) marcadas en un motivo de secuencia localizadas cada 5 kb en todo el genoma, para crear un patrón a modo de "código de barras" que se compara con el patrón estándar	Detecta delecciones e inserciones (>500 bp), inversiones y translocaciones, aneuploidías, triploidías	Trastornos de neurodesarrollo y anomalías congénitas sin diagnóstico	Detecta alteraciones estructurales no detectadas con otras técnicas	Mejora el diagnóstico molecular y detecta SVs que a menudo pasan desapercibidas con las técnicas de secuenciación estándar	Técnica novedosa. Todavía no se usa en la rutina diagnóstica. Análisis complejo.

Figura 1 Comparación de las diferentes técnicas que permiten detectar las CNVs y las SVs.

Fuente: Miller et al. 2010⁴.

D. Heine Suñer, V.J. Asensio and L. Torres Juan

deleciones. Sin embargo, su resolución es limitada, ya que solo puede detectar alteraciones que abarcan más de 5-10 Mb (millones de bases). Esta baja sensibilidad impide que el cariotipo sea útil para identificar microdelecciones o microduplicaciones que son la causa de los síndromes microdelecionales involucrados en muchas enfermedades genéticas pediátricas. A pesar de ello, sigue siendo una técnica fundamental para ciertos contextos clínicos, como el diagnóstico de aneuploidías o translocaciones equilibradas.

El MLPA representa un avance significativo en la capacidad de detección de variaciones genéticas específicas. Esta técnica molecular utiliza sondas diseñadas para regiones particulares del genoma y permite identificar duplicaciones o delecciones en genes de interés. También existe una modalidad de MLPA (MS-MLPA) que detecta cambios en la metilación del genoma asociados a síndromes de la impronta. Es especialmente útil cuando se sospecha de síndromes genéticos concretos, como la distrofia muscular de Duchenne, causada por alteraciones en el gen DMD (MLPA), o los síndromes de Prader-Willi y Angelman (MS-MLPA). La alta sensibilidad del MLPA en estos casos contrasta con su limitación de no poder detectar variaciones estructurales complejas (como inversiones o translocaciones) ni alteraciones fuera de las regiones específicas analizadas por las sondas. Por esta razón, su uso se restringe a situaciones en las que la sospecha clínica esté claramente dirigida.

En contraste, los *microarrays* representan una herramienta poderosa para el análisis genómico a gran escala, permitiendo la detección de CNVs a partir de aproximadamente 50 kb. Su cobertura del genoma es significativamente mayor que la del cariotipo o la MLPA, lo que los hace especialmente útiles en casos sin una sospecha clínica específica. Esta tecnología facilita la identificación de microdelecciones y microduplicaciones en todo el genoma, contribuyendo al diagnóstico de trastornos genéticos que podrían pasar desapercibidos con métodos convencionales. Si bien la mayoría de los *microarrays* no están diseñados para detectar mutaciones puntuales ni algunas variaciones estructurales complejas, ciertos formatos avanzados (SNP-arrays) pueden

identificar SNVs y regiones de pérdida de heterocigosidad. Aun así, en diagnóstico, su principal utilidad radica en la detección de alteraciones cromosómicas submicroscópicas, lo que los convierte en una herramienta de primera línea en el estudio de enfermedades genéticas. Ejemplos notables incluyen la detección de CNVs subteloméricas como causa de discapacidad intelectual idiopática o las duplicaciones en el cromosoma 16p11.2, vinculadas al autismo.

Dado que cada técnica tiene sus propias aplicaciones y limitaciones, en la práctica clínica, a menudo se combinan varias de estas herramientas para un diagnóstico más completo, dependiendo de los fenotipos y las sospechas clínicas.

Comparación de la secuenciación Sanger y NGS y su aplicación en la detección de SNVs y SVs

La secuenciación de Sanger y la secuenciación NGS son 2 tecnologías utilizadas para analizar principalmente SNVs, pero tienen diferencias significativas en cuanto a capacidad, eficiencia, coste y tipos de variantes que pueden detectar (fig. 2).

La secuenciación de Sanger es una técnica que se utiliza principalmente para secuenciar fragmentos de ADN pequeños. Aunque es una tecnología más antigua, sigue siendo ampliamente utilizada en la práctica clínica sobre todo para estudios familiares de variantes ya conocidas y que segregan con la enfermedad. Tiene una alta resolución para secuenciar genes específicos o exones, y aunque está limitada a secuencias cortas (aproximadamente 600-800 bases), presenta una tasa de error extremadamente baja. Es ideal para mutaciones puntuales específicas, como las que se encuentran en un solo gen o una región pequeña del genoma. Es una opción válida para confirmación de diagnóstico cuando se sospecha de una mutación conocida en un gen específico.

La NGS, también conocida como de segunda generación o secuenciación masiva paralela, ha revolucionado el diagnóstico genético permitiendo una secuenciación a gran escala

Técnicas de secuenciación existentes						
	TIPOS DE ALTERACIONES DETECTADAS	¿En qué consiste?	¿Qué detecta?	Rendimiento diagnóstico	Ventajas	Inconvenientes
Sanger	-	Una reacción de secuencia sobre un fragmento amplificado por PCR de 500-700 pb mediante terminadores marcados con fluorescencia	Detecta cualquier cambio de base que se ha producido en el fragmento secuenciado: mutaciones puntuales (SNVs)	Al secuenciarse un solo gen o parte de él, depende mucho de que la orientación diagnóstica sea acertada: "buscar una aguja en un pajar"	Útil para estudios de portadores con variante familiar SNV ya conocida o enfermedades con mutación recurrente (Ej. Acondroplasia)	Dirigido a una región concreta. Poco efectivo para secuenciar regiones del genoma enteras o genes grandes. No detecta CNVs
NGS-fragmentos cortos o 2 ^a generación	-	Secuenciación de alto rendimiento. Miles de reacciones de secuencia en paralelo a la vez. Genera secuencias cortas, de 100-400 pb	Puede detectar todos los cambios en las bases de ADN de un genoma entero (3000 millones de nucleótidos) y por su naturaleza cuantitativa, también delecciones y duplicaciones	Depende de la aproximación utilizada y patología (ver Figura 1 para ejemplos en exoma completo, WES)	No dirigido. Detecta diferentes tipos de variación: cambios de base (SNVs), delecciones y duplicaciones (CNVs) por todo el genoma	Puede ser laborioso encontrar las mutaciones que son patológicas entre las miles de variantes encontradas en cada individuo. Genera muchas variantes de significado incierto
TGS- fragmentos largos o 3 ^a generación	+	Miles de reacciones de secuencia en paralelo a la vez. Genera secuencias largas, de 10-15 kb (PacBio) o 10 kb-4 Mb (Nanopore)	Detecta CNVs y SVs con una elevada fiabilidad. También detecta expansiones repetitivas (STRs) y modificaciones epigenéticas (metilación)	Todavía no se ha implementado en la mayoría de rutinas diagnósticas. Sin embargo, dado que puede detectar cualquier tipo de alteración causante de enfermedad (SNV, CNV, SV, STRs y variación epigenética) su rendimiento será superior a las demás técnicas	Detecta todos los tipos de alteraciones del genoma causantes de enfermedad conocidos y además dado que se secuencian fragmentos muy largos se pueden haplotipar las variantes (determinar la fase)	Técnicas novedosas. No implementadas en la rutina diagnóstica. Falta de software de análisis a nivel de usuario

Figura 2 Comparación de las diferentes técnicas de secuenciación existentes.

¿Cuántos genes secuenciamos?

	Paneles	Exoma completo (WES)	Genoma completo (WGS)	Transcriptoma (RNAseq)
Genes	1-200 o +	20.000	20.000 + no-codificante	20.000
Coste	€	€€€	€€€€	€€
Cobertura genes	+++	++	+++++	NA
Profundidad	+++	++	+	NA
Ventajas	Responde específicamente a la pregunta clínica.	Detecta las variantes de todos los genes.	Detecta también variantes en zonas no codificantes	Indica genes alterados sin tener que conocer la variante
Inconvenientes	Se pueden escapar genes relevantes	Mucha información de genes no relevantes	Mucha información de genoma no codificante de difícil interpretación	Interpretación compleja y tejido-específica
Variantes significado incierto (VUS)	+	+++	+++++	Ayuda a reclasificar variantes VUS
Ejemplos de estudios en enfermedades pediátricas	Enfermedad renal infantil (382 genes) Blayer et al. 2022	Trastornos del neurodesarrollo Sanchez Suarez et al. 2024	Canalopatías y miocardiopatías pediátricas Kwok et al. 2024	Enfermedad neuromuscular Estevez-Arias et al 2024

Figura 3 Comparativa de las diferentes modalidades de secuenciación por NGS.

Fuente: Blayer et al. 2022⁵, Mergnac et al. 2022⁶, Sánchez-Suarez et al. 2024⁷, Kwok et al. 2024⁸ y Estevez-Arias et al. 2024⁹.

y a un coste proporcionalmente menor que las técnicas tradicionales. La NGS permite secuenciar grandes cantidades de ADN simultáneamente. Tiene capacidad para secuenciar paneles de genes, exomas completos (solo los exones de los genes) o genomas completos con alta resolución. Detecta SNVs, pero también CNVs y SVs. Aunque la NGS es más costosa que el Sanger para análisis de pocos genes, presenta mayor eficiencia cuando se necesitan analizar grandes paneles de genes o el exoma completo. Puede reducir el tiempo total de diagnóstico en comparación con las pruebas convencionales, especialmente cuando hay múltiples genes implicados. En general, tiene una precisión comparable al Sanger, aunque las tasas de error pueden ser mayores, especialmente en regiones repetitivas. La NGS es especialmente útil en situaciones donde los fenotipos no son específicos o cuando se sospecha entre múltiples trastornos genéticos. Ejemplos incluyen: autismo, cardiopatías congénitas o discapacidad intelectual. Requiere de bioinformática avanzada para procesar, analizar e interpretar los datos, lo que puede ser una barrera. La identificación de variantes de significado incierto puede dificultar el establecimiento de un diagnóstico definitivo.

La utilidad de paneles, exomas, genomas y RNAseq

La utilidad de los paneles de genes, exomas, genomas y RNAseq en la secuenciación NGS, para el diagnóstico de

enfermedades pediátricas varía según el contexto clínico, el presupuesto y los objetivos del análisis (fig. 3).

Los paneles de genes están dirigidos a un conjunto limitado de genes relacionados con enfermedades específicas. En general, se diseñan para cubrir exhaustivamente genes clave asociados con un fenotipo clínico concreto. Son más económicos en comparación con el exoma o el genoma completo y contienen menos datos que interpretar, lo que facilita una rápida identificación de variantes relevantes. Además, minimizan la posibilidad de identificar variantes genéticas no relacionadas con el problema clínico. Su principal desventaja es que puede fallar en el diagnóstico cuando el fenotipo está asociado a otros genes no contemplados en el panel. Son especialmente útiles para enfermedades monogénicas con sospechas diagnósticas claras (p. ej., distrofias musculares, Rendu-Osler, Alport).

El exoma (WES, del inglés *Whole exome sequencing*) es la parte del genoma que contiene los exones, que son las regiones codificantes de los genes responsables de producir proteínas. Al secuenciar el exoma, se analiza aproximadamente el 1-2% del genoma, pero sobre este pequeño porcentaje recaen hasta el 85% de las variantes conocidas relacionadas con enfermedades. Una ventaja sobre los paneles es que detecta variantes en genes inesperados que pueden explicar fenotipos complejos. Sin embargo, no detecta variantes en regiones reguladoras o intrónicas, que también pueden ser clínicamente relevantes. Además, se identifican muchas variantes, lo que puede aumentar el tiempo de interpretación respecto a un panel, así como un mayor riesgo de identificar variantes no relacionadas clíni-

D. Heine Suñer, V.J. Asensio and L. Torres Juan




Figura 4 Rendimiento diagnóstico del WES según el fenotipo estudiado calculado en las siguientes publicaciones científicas: [11-20](#).

*Estudios en TRIO.

camente. Está recomendado cuando el fenotipo es complejo o no se sospecha de un grupo específico de genes, aunque hoy en día se pueden crear paneles virtuales bioinformáticamente que eliminan los genes no relevantes para una enfermedad o fenotipo permitiendo el uso del exoma como si fueran paneles de genes.

El rendimiento diagnóstico del WES aplicado a la práctica clínica varía entre el 10% o más del 60%, dependiendo de las características clínicas de la cohorte analizada, el año de la prueba y la estrategia analítica¹⁰. En la figura 4 se puede observar el rendimiento diagnóstico del WES calculado en diferentes estudios realizados en población pediátrica y publicados recientemente (2023-2024). Destaca el elevado rendimiento observado en los pacientes sindrómicos (trastornos del neurodesarrollo más otros fenotipos como dismorfia facial, epilepsia, cardiopatía congénita o distonía) cuando se realiza la secuenciación en trio que asciende hasta el 75%¹¹. Por el contrario, los rendimientos más bajos se observan en arritmias y cardiopatías congénitas aisladas¹².

El genoma completo (WGS) es la secuenciación de toda la secuencia del ADN conocida. Es una prueba que abarca la mayoría de los tipos de variación al detectar variantes en regiones no codificantes, intrones y variantes estructurales, como inversiones, duplicaciones y delecciones (CNVs). Analizar el genoma completo puede evitar realizar otras pruebas específicas para detectar CNVs y SVs, como los microarrays, y podría ser una prueba de primera opción. Sin embargo, a día de hoy, no se encuentra todavía implantada en la rutina diagnóstica de la mayoría de laboratorios y se usa para enfermedades con etiología genética compleja o no conocida o que no se ha hallado variantes con otras técnicas o aproximaciones²¹. También, es adecuado para investigar nuevas asociaciones genéticas. Presenta un

coste mayor que otros enfoques, aunque actualmente está disminuyendo. También requiere de mayor tiempo y recursos para su análisis e interpretación. Igual que el exoma, puede revelar información inesperada o no deseada (p. ej., predisposición a enfermedades adultas).

Agregar la secuenciación de RNA (RNAseq) a la comparación entre paneles de genes, exomas y genomas proporciona una perspectiva más amplia, ya que el RNAseq permite explorar la expresión génica y eventos relacionados con el procesamiento del RNA (*splicing*). El RNAseq secuencia el transcriptoma, abarcando el RNA mensajero y otras formas de RNA. Detecta cambios en la expresión génica, aberraciones en el *splicing* y transcritos de fusión. Es útil en el diagnóstico de enfermedades causadas por variantes que alteran la expresión o el procesamiento del RNA e identifica los efectos funcionales de variantes en regiones reguladoras no codificantes o intrónicas. Complementa el exoma y el genoma para validar hallazgos genéticos. Sin embargo, depende del tejido utilizado, y como principio general, el RNA debe provenir del tejido afectado para detectar alteraciones relevantes. Además, no detecta variantes genómicas si éstas no afectan al RNA. A día de hoy su uso no es habitual en el diagnóstico de rutina y se ciñe más al ámbito de la investigación.

La selección de la técnica depende del caso clínico. Un enfoque escalonado es común, comenzando con paneles o exomas, seguido de genoma completo o RNAseq si no se encuentra un diagnóstico claro. En enfermedades pediátricas complejas, la combinación de técnicas (p. ej., genoma + RNAseq) puede ser clave para maximizar la precisión diagnóstica. De cualquier manera, tanto WGS como RNAseq no son todavía de uso habitual en el diagnóstico en nuestro entorno y su uso se ciñe más al ámbito de la investigación.

Tecnologías genómicas emergentes

La secuenciación de lectura larga (TGS, del inglés *Third Generation Sequencing*) y el mapeo óptico del genoma (OGM, del inglés *Optical Genome Mapping*) son tecnologías avanzadas que complementan e incluso pueden sustituir herramientas como la NGS y los *microarrays* en ciertos contextos. Estas técnicas han demostrado ser especialmente útiles en el diagnóstico de enfermedades pediátricas, donde las variantes estructurales complejas, difíciles de detectar con NGS, pueden ser responsables de la enfermedad.

El OGM permite la detección de variantes estructurales en todo el genoma mediante la visualización física de moléculas de ADN extremadamente largas (hasta cientos de kilobases). Su alta sensibilidad lo hace ideal para identificar translocaciones, inversiones, grandes delecciones, duplicaciones y variantes en el número de copias (CNVs), incluidas aquellas en regiones repetitivas y no codificantes. A diferencia de la NGS, no requiere amplificación ni secuenciación, lo que reduce sesgos metodológicos. No obstante, presenta limitaciones en la detección de variantes pequeñas (< 500 pb) y su implementación sigue siendo costosa en términos de instrumentación y análisis. Su utilidad radica en la identificación de alteraciones estructurales no detectadas por NGS, como en algunos síndromes de delección/duplicación o en ciertos casos de cáncer pediátrico.

Por otro lado, la secuenciación de lectura larga (TGS) genera fragmentos de ADN de gran longitud (kilobases), permitiendo un mapeo más preciso de regiones genómicas complejas. Es especialmente útil para detectar variantes estructurales difíciles de resolver con las lecturas cortas de la NGS y para analizar repeticiones en tandem, relevantes en enfermedades como la distrofia miotónica o el síndrome de X frágil. Además, cuando se aplica en RNAseq, facilita la identificación de isoformas alternativas del ARN. A pesar de sus ventajas, la TGS sigue siendo más costosa que la NGS y presenta una mayor tasa de error inicial, lo que requiere infraestructura especializada tanto para la generación de datos como para su análisis.

En conjunto, tanto el OGM como la TGS representan avances significativos para mejorar el diagnóstico en casos genéticos complejos, especialmente cuando las pruebas estándar (paneles, exoma o genoma) no han sido concluyentes. Con el tiempo, su evolución tecnológica y la reducción de costos determinarán si pueden reemplazar a la NGS como prueba diagnóstica de primera línea. Sin embargo, el aumento en el rendimiento de estas técnicas, sigue siendo limitado, con mejoras de no más del 10%, posiblemente debido a factores no genéticos o poligénicos.

Conclusiones

Las nuevas tecnologías genómicas están revolucionando el diagnóstico en pediatría y mejorando la identificación de enfermedades genéticas, aunque aún existen desafíos en la interpretación y accesibilidad de estas pruebas. A medida que avanza la tecnología, la secuenciación del exoma y el genoma completo están cobrando mayor relevancia en la práctica clínica, facilitando diagnósticos más rápidos y precisos. Sin embargo, su implementación requiere de mejoras en bioinformática, interpretación de datos y accesibilidad.

En este contexto, el fenotipado preciso es clave para optimizar el análisis genético y reducir la incertidumbre en los resultados. Además, la combinación de diferentes técnicas (cariotipo, MLPA, *microarrays*, NGS) permite una evaluación más exhaustiva de las variantes genómicas.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

1. *The Lancet Global Health. The landscape for rare diseases in 2024.* Lancet Glob Health. 2024;12:e341.
2. Slavotinek A, Rego S, Sahin-Hodoglugil N, Kvale M, Lianoglou B, Yip T, et al. Diagnostic yield of pediatric and prenatal exome sequencing in a diverse population. NPJ Genom Med. 2023;8:10.
3. Köhler S, Gargano M, Matentzoglu N, Carmody LC, Lewis-Smith D, Vasilevsky NA, et al. The Human Phenotype Ontology in 2021. Nucleic Acids Res. 2021;49:D1207–17.
4. Miller DT, Adam MP, Aradhya S, Biesecker LG, Brothman AR, Carter NP, et al. Consensus statement: Chromosomal microarray is a first-tier clinical diagnostic test for individuals with developmental disabilities or congenital anomalies. Am J Hum Genet. 2010;86:749–64.
5. Bleyer AJ, Westemeyer M, Xie J, Bloom MS, Brossart K, Eckel JJ, et al. Genetic Etiologies for Chronic Kidney Disease Revealed through Next-Generation Renal Gene Panel. Am J Nephrol. 2022;53:297–306.
6. Mergnac JP, Wiedemann A, Chery C, Ravel JM, Namour F, Guéant JL, et al. Diagnostic yield of clinical exome sequencing as a first-tier genetic test for the diagnosis of genetic disorders in pediatric patients: Results from a referral center study. Hum Genet. 2022;141:1269–78.
7. Sánchez Suárez A, Martínez Menéndez B, Escolar Escamilla E, Martínez Sarries FJ, Esparza Garrido MI, Gil-Fournier B, et al. Whole Exome Sequencing and Panel-Based Analysis in 176 Spanish Children with Neurodevelopmental Disorders: Focus on Autism Spectrum Disorder and/or Intellectual Disability/Global Developmental Delay. Genes (Basel). 2024;15.
8. Kwok SY, Kwong AKY, Shi JZ, Shih CFY, Lee M, Mak CCY, et al. Whole genome sequencing in paediatric channelopathy and cardiomyopathy. Front Cardiovasc Med. 2024;11:133527.
9. Estévez-Arias B, Matalonga L, Yubero D, Polavarapu K, Codina A, Ortez C, et al. Phenotype-driven genomics enhance diagnosis in children with unresolved neuromuscular diseases. Eur J Hum Genet. 2025;33:239–47.
10. Lalonde E, Rentas S, Lin F, Dulik MC, Skraban CM, Spinner NB. Genomic Diagnosis for Pediatric Disorders: Revolution and Evolution. Front Pediatr. 2020;8:373.
11. Li C, Wang Y, Zeng C, Huang B, Chen Y, Xue C, et al. Trio-whole exome sequencing reveals the importance of de novo variants in children with intellectual disability and developmental delay. Sci Rep. 2024;14:27590.
12. Slavotinek AM, Thompson ML, Martin LJ, Gelb BD. Diagnostic yield after next-generation sequencing in pediatric cardiovascular disease. HGG Adv. 2024;5:100286.
13. Gippert S, Wagner M, Brunet T, Berruti R, Brugger M, Schwabold EMC, et al. Exome sequencing (ES) of a pediatric cohort with chronic endocrine diseases: A single-center study (within the framework of the TRANSLATE-NAMSE project). Endocrine. 2024;85:444–53.
14. Chen Y, Zhang Y, Huang J, Zeng Y, Qian Y, Chen J, et al. New insights from trio whole-exome sequencing in the children with kidney disease: A single-center retrospective cohort study. Mol Genet Genomic Med. 2023;11:e2163.

D. Heine Suñer, V.J. Asensio and L. Torres Juan

15. Wayhelova M, Vallova V, Broz P, Mikulasova A, Smetana J, Dynkova Filkova H, et al. Exome sequencing improves the molecular diagnostics of paediatric unexplained neurodevelopmental disorders. *Orphanet J Rare Dis.* 2024;19:41.
16. Graifman JL, Lippa NC, Mulhern MS, Bergner AL, Sands TT. Clinical utility of exome sequencing in a pediatric epilepsy cohort. *Epilepsia.* 2023;64:986–97.
17. Piñeros-Fernández MC, Morte B, García-Giménez JL. Utility of exome sequencing for the diagnosis of pediatric-onset neuromuscular diseases beyond diagnostic yield: A narrative review. *Neurol Sci.* 2024;45:1455–64.
18. Hayman T, Millo T, Handler K, Chowers I, Gross M, Banin E, et al. Whole exome sequencing of 491 individuals with inherited retinal diseases reveals a large spectrum of variants and identification of novel candidate genes. *J Med Genet.* 2024;61: 224–31.
19. Perry J, Redfield S, Oza A, Rouse S, Stewart C, Khela H, et al. Exome Sequencing Expands the Genetic Diagnostic Spectrum for Pediatric Hearing Loss. *Laryngoscope.* 2023;133:2417–24.
20. Alix T, Chéry C, Josse T, Bronowicki JP, Feillet F, Guéant-Rodriguez RM, et al. Predictors of the utility of clinical exome sequencing as a first-tier genetic test in patients with Mendelian phenotypes: Results from a referral center study on 603 consecutive cases. *Hum Genomics.* 2023;17:5.
21. Wojcik MH, Lemire G, Berger E, Zaki MS, Wissmann M, Win W, et al. Genome Sequencing for Diagnosing Rare Diseases. *N Engl J Med.* 2024;390:1985–97.