



IMÁGENES EN PEDIATRÍA

Dermatosis *terra firma-forme*

*Terra firma-forme* dermatosis



C. Meseguer-Yebra<sup>a,\*</sup>, P. Meseguer-Yebra<sup>b</sup>, A.A. Garrido-Ríos<sup>c</sup> y J. Sánchez Estella<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Sección de Dermatología, Complejo Asistencial de Zamora, Zamora, España

<sup>b</sup> Pediatría de Atención Primaria, Centro de Salud de Tordoia, A Coruña, España

<sup>c</sup> Servicio de Dermatología, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid, España

Disponible en Internet el 4 de agosto de 2014

La dermatosis *terra firma-forme* (DTFF), es una condición benigna de etiología desconocida, que toma dicho nombre de la coloración pardusca que remeda tierra o suciedad. Descrita en el año 1987 por Duncan et al.<sup>1</sup>, principalmente se localiza en el cuello, el tronco, los brazos y los tobillos de niños y jóvenes<sup>2</sup> (figs. 1 y 2), aunque también se han descrito casos en adultos y en otras localizaciones. Dicha coloración

terrosa es asintomática y puede mantenerse de forma indefinida durante años puesto que es resistente al lavado convencional con agua y jabón, ocasionando un indudable problema cosmético para los pacientes y sus familiares. Sin embargo, y como se muestra en la figura 3, desaparece fácilmente al frotar la piel con una gasa impregnada en alcohol isopropílico. La biopsia, que solo es necesaria en casos excepcionales muestra acantosis epidérmica e hiperqueratosis lamelar con focos de ortoqueratosis compacta formando remolinos<sup>3</sup>. Entre los diagnósticos diferenciales se incluyen: la acantosis nigricans, la papilomatosis reticular y confluyente de Gougerot y Carteaud, la hiperpigmentación



**Figura 1** Paciente de 14 años, sana, con coloración pardusca asintomática de aspecto aterciopelado de más de un año de evolución localizada en la región anterolateral del cuello.



**Figura 2** Hiperpigmentación de aspecto reticulado afectando de forma semicircular a la cara posterior de ambos tobillos.

\* Autor para correspondencia.  
Correo electrónico: [comesye@hotmail.com](mailto:comesye@hotmail.com)  
(C. Meseguer-Yebra).



**Figura 3** Eliminación de las lesiones tras frotar con una gasa impregnada en alcohol isopropílico al 70%.

postinflamatoria y la dermatosis neglecta. Esta última se diferencia de la DTFF en que se observa en áreas en las que no se realiza una higiene adecuada, bien por una movilidad limitada del paciente o por una hiperalgesia localizada<sup>4</sup>. La

DTFF es una entidad probablemente infradiagnosticada que, cuando es reconocida, tiene un fácil diagnóstico clínico y un tratamiento rápido y barato con escasas recidivas. Por el contrario, su desconocimiento puede acarrear preocupación en los padres y una serie de pruebas complementarias complejas e innecesarias.

### Bibliografía

1. Duncan WC, Tschien JA, Knox JM. *Terra firma-forme* dermatosis. Arch Dermatol. 1987;123:567-9.
2. Berk DR. *Terra firma-forme* dermatosis: A retrospective review of 31 patients. Pediatr Dermatol. 2012;29:297-300.
3. Browning J, Rosen T. *Terra firma-forme* dermatosis revisited. Dermatol Online J. 2005;11:15.
4. Martín-Gorgojo A, Alonso-Usero V, Gavrilova M, Jordá-Cuevas E. Dermatitis neglecta or *terra firma-forme* dermatosis. Actas Dermosifiliogr. 2012;103:932-4.