



IMÁGENES EN PEDIATRÍA

Liquen *striatus*

Lichen striatus



Israel Pérez-López^{a,*} y Paula Aguayo-Carreras^b

^a Servicio de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, Hospital General Básico de Baza, Baza, Granada, España

^b Servicio de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, Hospital Clínico San Cecilio, Granada, España

Disponible en Internet el 28 de noviembre de 2018

Niño de 5 años que consultó por erupción cutánea asintomática de 5 meses de evolución. En la exploración destacaban múltiples pápulas milimétricas, blanquecinas, de superficie aplanada que se distribuían de forma lineal desde hemitorax izquierdo (fig. 1) hacia raíz de miembro ipsilateral siguiendo las líneas de Blaschko. La biopsia cutánea fue compatible con liquen *striatus*. Se explicó a sus padres el carácter benigno y autolimitado del proceso desestimando realizar tratamiento.

El liquen estriado es una dermatosis inflamatoria poco frecuente que encuentra su mayor incidencia en la edad infantil, y algunos estudios muestran predominancia en el sexo femenino¹. Cursa con pápulas milimétricas, planas y de aspecto liquenoide que se agrupan siguiendo las líneas de Blaschko³. La etiología no es conocida, aunque se cree que estímulos externos inducirían la expresión de unos clones de queratinocitos anómalos, que seguirían las líneas de Blaschko, esto es, un mosaicismo cutáneo, cuyo resultado sería una reacción inflamatoria mediada por linfocitos T^{2,3}. Hay numerosas entidades que siguen este patrón de presentación, unas en relación con trastornos de la pigmentación cutánea, otras con relación a dermatosis inflamatorias. Con estas últimas (liquen plano lineal, la psoriasis lineal, el nevus epidérmico o el liquen *striatus*) son con las que tenemos que plantear el diagnóstico diferencial del caso que nos ocupa.



Figura 1 Pápulas milimétricas, blanquecinas y planas con patrón de distribución blaschkoide.

Bibliografía

1. García-Briz MI, Santos-Alarcón S, Fuertes-Prosper MD, Mateu-Puchades A. Liquen estriado en la infancia ¿Una entidad relacionada con la dermatitis atópica? Actas Dermosifiliogr. 2017;108:882-4.
2. Bordel Gómez MT. Liquen estriado. An Pediatr (Barc). 2005;62:381-92.
3. Taieb A, el Youbi A, Grosshans E, Maleville J. Lichen striatus: Clinical and laboratory features of 115 children. Pediatr Dermatol. 2004;21:197-204.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [\(I. Pérez-López\).](mailto:ipl_elmadrono@hotmail.com)