



IMÁGENES EN PEDIATRÍA

Lesión de aspecto arrosariado a nivel perineal

Bead-like lesion at perineal region



Juan Pablo Velasco-Amador*, Israel Pérez-López y Ricardo Ruiz-Villaverde

Unidad de Gestión Clínica de Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología, Hospital Universitario San Cecilio, Granada, España

Disponible en Internet el 26 de noviembre de 2022

Varón de 3 años, sin antecedentes de interés, derivado a la consulta de dermatología pediátrica por presentar lesiones a nivel perineal desde el nacimiento. En la exploración, el paciente presentaba numerosos quistes de pequeño tamaño arrosariados y confluyentes con disposición lineal, desde la parte distal del pene siguiendo por el rafe ventral hasta la zona perianal, constituyendo un cordón (fig. 1). Las lesiones eran asintomáticas, y no presentaban signos de infección. Se realizó una ecografía de riñón, vías urinarias y de la lesión de mayor tamaño, confirmando que se trataba de una lesión hipoeocoica y con refuerzo acústico posterior.

Por las características de las lesiones, y por la ausencia de alteraciones en la prueba de imagen se realizó el diagnóstico final de quistes de rafe medio perineal. Los quistes de rafe medio son una afección del aparato genital masculino poco frecuente¹. Suelen localizarse desde la parte distal del pene hasta la zona perianal, siendo su diagnóstico clínico¹. Se consideran defectos del desarrollo embriológico por alteraciones en la fusión de los pliegues uretrales y la placa genital². La mayoría de los casos son asintomáticos siendo la complicación más frecuente la sobreinfección². A



Figura 1 Lesiones quísticas arrosariadas a nivel del rafe medial.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [\(J.P. Velasco-Amador\).](mailto:pablova.correo@gmail.com)

pesar de ser una entidad benigna, el tratamiento de elección suele ser quirúrgico para evitar complicaciones³.

Bibliografía

1. López-Candela E, Roig Álvaro J, López-Candel J, Fernández Dozagarat S, Soler J, Hernández Bermejo JP, et al. Quistes del rafe medio perineal en la infancia. *An Pediatr.* 2000;52:395–7.
2. Hernández Peláez L, Pontón Martino B, Alonso Losada D, Ordoñez Álvarez FÁ. Quistes del rafe medio: una entidad poco habitual. *Piel.* 2021;36:129.
3. Navalón-Monllor V, Ordoño-Saiz MV, Ordoño-Domínguez F, Sabater-Marco V, Pallás-Costa Y, Navalón-Verdejo P. Quistes de rafe medio en el varón. Presentación de nuestra experiencia y revisión de la literatura. *Actas Urol Esp.* 2017;41:205–9.