



CARTA CIENTÍFICA

Uso de antibióticos en niños hospitalizados por infecciones respiratorias víricas: magnitud y factores asociados

Antibiotic therapy in children hospitalized for viral respiratory infections: Magnitude and related factors

Sra. Editora,

Las infecciones del tracto respiratorio inferior (ITRI) son la principal causa de hospitalización en niños, incluyendo bronquiolitis, neumonía adquirida en la comunidad, bronquitis y otras infecciones no especificadas. La mayoría son de origen vírico y no requieren tratamiento antibiótico¹. Sin embargo, es frecuente el uso innecesario de antibióticos en estos pacientes². Esta prescripción inadecuada podría deberse a circunstancias de la enfermedad, de los pacientes o de la asistencia sanitaria (gravedad, enfermedades coexistentes, disponibilidad de recursos), pero también puede deberse a hábitos clínicos asociados al uso excesivo de pruebas diagnósticas y de tratamientos³. El objetivo de este estudio fue medir la frecuencia de uso de antibióticos en niños hospitalizados por ITRI virales y explorar los factores relacionados con esta terapia antibiótica.

Se estudió una cohorte de niños (21 días-14 años), hospitalizados (enero de 2019-enero de 2023) desde urgencias en un hospital terciario, primariamente por ITRI, que no requirieron cuidados intensivos (podían haber recibido ventilación no invasiva) y con resultado positivo en una prueba de reacción en cadena de polimerasa (PCR) para virus respiratorios (influenza, virus respiratorio sincitial [VRS], adenovirus, bocavirus, coronavirus [NL63, 229E, OC43], enterovirus, parainfluenza, metapneumovirus, rinovirus y [desde 2020] SARS-CoV-2). Se excluyeron pacientes que solo dieron positivo en SARS-CoV-2, con enfermedades crónicas complejas, con diagnóstico concurrente de infección probablemente bacteriana, o con alguna prueba bacteriológica positiva en muestra biológica. En este hospital solo se dispone precozmente (24 horas) de resultados de PCR para influenza, VRS y SARS-CoV-2. De las historias clínicas se recogieron datos de evolución clínica, pruebas diagnósticas y tratamiento.

Mediante chi cuadrado o pruebas Mann-Whitney se estudió la asociación de la antibioterapia con variables relacionadas con la gravedad clínica y el uso de métodos diagnósticos. Las variables significativas ($p < 0,05$) en ese análisis se incluyeron en un modelo de regresión logística multivariante. Se realizó un análisis de sensibilidad, repitiendo el modelo multivariante en submuestras específicas.

De 490 niños hospitalizados por ITRI, se excluyeron 109 por no identificarse ningún virus o solo SARS-CoV-2, 6 por necesitar cuidados intensivos, 2 por infecciones bacterianas asociadas y 7 por enfermedad crónica compleja, dejando una muestra final de 366 pacientes. Sus características se muestran en la [tabla 1](#). Todos los pacientes tuvieron PCR positiva, sobre todo para VRS (41,7%) y rinovirus (21,0%).

Recibieron antibióticos 46 pacientes (12,6%). La mayoría (69,6%) de los antibióticos fueron aminopenicilinas, pero el 23,9% recibieron una cefalosporina de tercera generación. Se administraron antibióticos al 4,0% de las bronquiolitis, al 5,7% de las bronquitis sibilantes, al 12,8% de ITRI no especificadas y al 48,1% de las neumonías. En 28 de esos 46 pacientes (60,9%) se continuó el tratamiento antibiótico tras el alta, siendo esto menos frecuente en las infecciones confirmadas precozmente (VRS e influenza): 45,8% vs 77,3%, $p = 0,038$.

En análisis bivariante, las variables estadísticamente relacionadas con la antibioterapia fueron ([material suplementario, tablas 1S y 2S](#)): mayor edad, mayor temperatura, haber recibido alguna vacuna antineumocócica, no tener dificultad respiratoria, recibir antibióticos antes de la hospitalización, diagnóstico de neumonía y haberse realizado análisis de sangre, radiografía de tórax, urocultivo o hemocultivo. Entre los pacientes a quienes se realizó análisis de sangre, las cifras de neutrófilos, proteína C reactiva y procalcitonina fueron mayores en los que recibieron antibióticos. Cuando se había hecho radiografía de tórax, la consolidación se asoció con mayor frecuencia de antibioterapia (75,0%) que en radiografías normales (11,1%) o con otros infiltrados (16,0%), $p < 0,001$.

El análisis multivariante ([tabla 2](#)) identificó como únicas variables relacionadas con la antibioterapia la realización de radiografía de tórax, análisis de sangre y hemocultivo. El análisis de sensibilidad ([material suplementario, tabla 3S](#)) confirmó estos resultados. En otro modelo de regresión, los resultados de los estudios complementarios no mostraron asociación significativa con la antibioterapia ([material suplementario, tabla 4S](#)).

<https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2024.503708>

1695-4033/© 2024 Asociación Española de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la CC BY-NC-ND licencia (<http://creativecommons.org/licencias/by-nc-nd/4.0/>).

Cómo citar este artículo: I. Ferrer Ortiz, P. Andrés Porras, N. Cabeza Arce et al., Uso de antibióticos en niños hospitalizados por infecciones respiratorias víricas: magnitud y factores asociados, Anales de Pediatría, <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2024.503708>

Tabla 1 Características de la muestra

Variable		n
Sexo varón (n, %)	210 (57,4%)	366
Edad, meses (mediana y RIC)	9,9 (2,9-26,2)	366
Edad < 12 meses (n, %)	201 (54,9%)	366
Vacuna antineumocócica, alguna dosis (n, %)	297 (81,1%)	366
Diagnóstico clínico		366
Bronquiolitis	175 (47,8%)	
ITRI no especificada	86 (23,5%)	
Neumonía	52 (14,2%)	
Bronquitis espástica	53 (14,5%)	
Antibióticos antes de la hospitalización (n, %)	19 (7,0%)	270
Dificultad respiratoria (n, %)	344 (94,0%)	366
Sibilancias (n, %)	199 (54,4%)	366
Tos (n, %)	333 (92,8%)	359
Temperatura máxima, °C (mediana y RIC)	38,3 (37,4-39,0)	312
Virus sincitial respiratorio (n, %)	204 (55,7%)	366
Influenza (n, %)	15 (4,1%)	366
Virus con resultados en < 24 horas (n, %)	218 (59,6%)	366
Días de hospitalización (mediana y RIC)	3,0 (2,0-5,0)	366
Radiografía de tórax (n, %)	131 (35,8%)	366
Análisis de sangre (n, %)	108 (29,5%)	366
Hemocultivo (n, %)	42 (11,5%)	366
Urocultivo (n, %)	11 (3,0%)	366
Punción lumbar (n, %)	1 (0,3%)	366
Oxígeno suplementario (n, %)	280 (76,5%)	366
Ventilación no invasiva (n, %)	168 (45,9%)	366
Corticosteroides (n, %)	91 (24,9%)	366
Antibióticos (n, %)	46 (12,6%)	366
Días de antibioterapia* (mediana y RIC)	3,0 (2,0-4,0)	46
Antibióticos orales (n, %)	19 (5,2%)	366
Antibióticos parenterales (n, %)	39 (10,7%)	366
Antibióticos al alta (n, %)	28 (7,7%)	366
Leucocitos, céls/ μ l (mediana y RIC)	10.800 (8.175-15.975)	102
Neutrófilos, céls/ μ l (mediana y RIC)	6.300 (4.275-10.125)	102
Proteína C reactiva, mg/l (mediana y RIC)	19,6 (8,8-66,6)	98
Procalcitonina, ng/ml (mediana y RIC)	0,32 (0,10-1,25)	61

ITRI: infección del tracto respiratorio inferior; RIC: rango intercuartil.

* Si el tratamiento se administró < 24 horas, se computó como 0 días.

Tabla 2 Análisis multivariante

Variables en el modelo de regresión logística	OR (IC 95%)	p
> 12 meses	3,3 (0,7-15,0)	0,124
Temperatura máxima (cada °C)	1,4 (0,7-2,6)	0,297
Dificultad respiratoria	2,5 (0,4-14,7)	0,312
Antibióticos antes de la hospitalización	1,8 (0,4-7,5)	0,404
Diagnóstico clínico de neumonía	1,9 (0,5-7,2)	0,317
Cultivo de orina	4,5 (0,5-38,5)	0,165
Hemocultivo	17,4 (4,1-74,4)	< 0,001
Análisis de sangre	4,4 (1,2-16,2)	0,026
Radiografía de tórax	5,5 (1,3-23,4)	0,020
Vacuna antineumocócica, alguna dosis	0,3 (0,1-2,5)	0,257

IC 95%: intervalo de confianza al 95%; OR: odds ratio.

En conclusión, uno de cada ocho niños previamente sanos hospitalizados por una ITRI vírica y que no requirió cuidados intensivos recibió antibióticos. Aunque es una cifra inferior a la informada en otros estudios recientes⁴⁻⁶ (25-75%), hay que considerar que la muestra aquí estudiada está muy seleccionada, al excluir pacientes con alguna posible infección bacteriana asociada (p.ej., otitis media) y pacientes con condiciones de riesgo.

Los factores asociados a la antibioterapia no eran indicadores de gravedad (p.ej., necesidad de oxígeno o ventilación no invasiva, temperatura, síntomas respiratorios) ni circunstancias asistenciales (p.ej., antibióticos previos a la hospitalización, disponibilidad tardía de resultados de PCR víricos). A diferencia de otros estudios⁹, no se encontraron resultados analíticos o radiológicos relacionados independientemente con la antibioterapia. Los factores asociados al uso de antibióticos fueron decisiones como realizar radiografía de tórax, análisis de sangre o hemocultivo. Los resultados parecen indicar que la antibioterapia innecesaria es, sobre todo, parte de una práctica clínica que combina un exceso de pruebas diagnósticas y de tratamientos.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2024.503708>.

Bibliografía

1. Cotter JM, Florin TA, Moss A, Suresh K, Navanandan N, Ramgopal S, et al. Antibiotic use and outcomes among children hospitalized with suspected pneumonia. *J Hosp Med.* 2022;17:975–83, <http://dx.doi.org/10.1002/jhm.13002>.
2. Poutanen R, Korppi M, Csonka P, Pauniahio S-L, Renko M, Palmu S. Use of antibiotics contrary to guidelines for children's lower respiratory tract infections in different health care settings. *Eur J Pediatr.* 2023;182:4369–77, <http://dx.doi.org/10.1007/s00431-023-05099-6>.
3. Størdal K, Wyder C, Trobisch A, Grossman Z, Hadjipanayis A. Overtesting and overtreatment-statement from the European Academy of Paediatrics (EAP). *Eur J Pediatr.* 2019;178:1923–7, <http://dx.doi.org/10.1007/s00431-019-03461-1>.
4. Schober T, Morris SK, Bettinger JA, Burton C, Halperin SA, Jadavji T, et al., Canadian Immunization Monitoring Program Active (IMPACT) Investigators. Antibiotic use in children hospitalised for influenza, 2010-2021: The Canadian Immunization Monitoring Program Active (IMPACT). *Infection.* 2024;52:865–75, <http://dx.doi.org/10.1007/s15010-023-02124-6>.
5. Papan C, Willersinn M, Weiß C, Karremann M, Schrotten H, Tenenbaum T. Antibiotic utilization in hospitalized children under 2 years of age with influenza or respiratory syncytial virus infection – a comparative, retrospective analysis. *BMC Infect Dis.* 2020;20:606, <http://dx.doi.org/10.1186/s12879-020-05336-5>.
6. Kohns Vasconcelos M, Meyer Sauter PM, Keitel K, Santoro R, Egli A, Coslovsky M, et al. Detection of mostly viral pathogens and high proportion of antibiotic treatment initiation in hospitalised children with community-acquired pneumonia in Switzerland – baseline findings from the first two years of the KIDS-STEP trial. *Swiss Med Wkly.* 2023;153:40040, <http://dx.doi.org/10.57187/smw.2023.40040>.

Inés Ferrer Ortiz^a, Pilar Andrés Porras^a,
Nuria Cabeza Arce^a, Isabel Bullón González^a
y Alfredo Cano^{a,b,*}

^a Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España

^b Facultad de Medicina, Universidad de Valladolid, Valladolid, España

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: acanog@saludcastillayleon.es
(A. Cano).